

Đừng Dùng Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Như Phương Pháp Ngừa Thai Thông Thường

Thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Thuốc này không có hiệu quả như các cách thức ngừa thai thông thường.

Nếu bạn giao hợp bạn nên dùng phương pháp ngừa thai thông thường (như thuốc viên ngừa thai, bao cao su, thuốc ngừa thai chích, v.v...)

Tại Sao?

- Thuốc ngừa thai khẩn cấp không bảo vệ bạn những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và bệnh AIDS (SIDA).
- Bạn nên dùng bao cao su để tránh những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và AIDS.

Loại Thuốc Này An Toàn Không?

Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Liệu Hoa Kỳ (FDA) đã cho biết là thuốc ngừa thai khẩn cấp là một loại thuốc được chọn lựa an toàn để giúp bạn giảm bớt cơ hội thụ thai sau khi giao hợp mà bạn không dùng phương pháp ngừa thai nào.

Nếu vì lý do gì mà bạn không nên dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp, bạn hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm hiểu thêm.

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Có Phản Ứng Phụ Không?

Thuốc ngừa thai khẩn cấp làm cho một số người phụ nữ cảm thấy khó chịu nơi bụng hay ói mửa. Một số phụ nữ có thể thấy đau ở vú hay nhức đầu. Các phản ứng phụ này thường chỉ kéo dài trong vòng một ngày mà thôi. Thuốc ngừa thai khẩn cấp PROGESIN-ONLY có ít phản ứng phụ hơn. Thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng có thể làm cho kinh nguyệt của bạn đến trễ hay sớm hơn bình thường.

Tôi Có Thể Tìm Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Ở Đâu?

Bạn có thể xin toa thuốc ngừa thai khẩn cấp từ bác sĩ gia đình hay từ các trạm y tế công cộng. Ở một số nơi người phụ nữ có thể đi trực tiếp tới các cửa hiệu bán thuốc tây để mua thuốc này.

Bạn có thể lên mạng Internet để biết thêm chi tiết về “cách làm thế nào để tìm thuốc ngừa thai khẩn cấp ở Mỹ và Canada” và địa chỉ trên máy vi tính của “EC Pill Brands Worldwide” là:

<http://www.not-2-late.com>

(Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Tiếng Pháp và Tiếng Ả Rập)

1 - 888 - 668 - 2528

(1 - 888 - NOT - 2 - LATE)



PATH là một tổ chức quốc tế, phục vụ bất vụ lợi để cải thiện tình trạng sức khỏe của toàn cầu. Hợp tác với các cơ quan y tế công cộng và tư nhân. PATH phát triển những phương pháp kỹ thuật thích hợp và sáng tạo những biện pháp thích ứng về văn hóa cho những vấn đề thuộc về sức khỏe của cộng đồng. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết qua máy vi tính www.path.org

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp



Không bao giờ gọi là quá trễ để ngăn ngừa sự thụ thai

Bạn Có Lo Ngại Rằng Mình Mang Thai Không?

Hãy nghĩ đến chuyện dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp nếu bạn giao hợp trong 5 ngày vừa qua và:


- Bạn đã không dùng một phương pháp ngừa thai nào.
- Bao cao su bị rách.
- Bạn trễ hẹn đi chích thuốc ngừa thai.
- Bạn quên uống thuốc liên tiếp trong hai ngày hay nhiều hơn hoặc bạn bắt đầu dùng thuốc vi thuốc ngừa thai trễ.
- Bạn bị cưỡng bức giao hợp.

Bạn hãy nghĩ đến phương pháp ngừa thai khẩn cấp để tránh mang thai sau khi giao hợp.

Có hai cách để tránh mang thai trong trường hợp khẩn cấp:

1. Thuốc ngừa thai khẩn cấp viên được dùng trong vòng 5 ngày sau khi giao hợp.
2. Đặt vòng xoắn được dùng trong vòng 7 ngày sau khi giao hợp.

Nếu bạn cần biết thêm chi tiết, nên hỏi bác sĩ gia đình của bạn.



<http://www.not-2-late.com>

(Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Tiếng Pháp và Tiếng Ả Rập)

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Là Gì?

Thuốc ngừa thai khẩn cấp (còn được gọi là ECPs) là một loại thuốc ngừa thai thông thường được dùng với lượng thuốc đặc biệt trong vòng 5 ngày sau khi giao hợp để tránh mang thai.

Có hai loại thuốc ngừa thai khẩn cấp:

- Viên thuốc progestin-only (Plan B®) làm giảm cơ hội mang thai 89 phần trăm.
- Estrogen/progestin viên có thể làm giảm cơ hội mang thai 75 phần trăm.

Được dùng với lượng thuốc đặc biệt, một vài loại thuốc ngừa thai thông thường có thể được dùng như thuốc ngừa thai khẩn cấp.

Những địa chỉ qua máy vi tính có đưa ra những loại thuốc và cách dùng ở mỗi quốc gia: <http://www.not-2-late.com>

Làm thế nào để dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp?

- Bạn có thể uống thuốc viên progestin-only hoặc là một liều lượng thuốc hay hai liều thuốc: Liều thuốc đầu tiên trong vòng 120 giờ sau khi bạn giao hợp mà không dùng phương pháp ngừa thai nào và liều thuốc thứ hai được dùng ngay trong 12 giờ sau đó.
- Bạn phải dùng hai liều thuốc viên estrogen hay progestin: Lần đầu trong vòng 120 giờ và lần thứ hai 12 giờ sau đó.
- Dùng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ hay uống theo liều lượng nào thích hợp với bạn nhất.

Đừng Đợi!

Để tránh mang thai, bạn cần phải dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp trong vòng 5 ngày (120 giờ) sau khi giao hợp. Thuốc ngừa thai khẩn cấp có nhiều hiệu quả hơn nếu bạn dùng ngay sau khi giao hợp.



Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Có Công Hiệu Như Thế Nào?

Các sự nghiên cứu về y khoa nói rằng trong nhiều trường hợp, thuốc ngừa thai khẩn cấp giúp tránh mang thai bằng cách tạm thời ngừng sự rụng trứng hay làm chậm tiến trình của sự rụng trứng. Điều này có thể ngăn ngừa sự thụ tinh nhưng không ngăn chặn được những gì xảy ra sau khi thụ tinh.

Thuốc ngừa thai khẩn cấp sẽ không giúp được gì cho bạn nếu bạn đã mang thai. Thuốc ngừa thai khẩn cấp không phải là thuốc phá thai.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi Đường Dây Ngừa Thai Khẩn Cấp. Phục vụ miễn phí, kín đáo, 24 tiếng một ngày.



1 - 888 - 668 - 2528

(1 - 888 - NOT - 2 - LATE)